

# TRACTAMENT AMB FINGOLIMOD

## Posologia:



Prendre 1 comprimit al dia, amb aliments o sense, preferentment al matí.


## Efectes secundaris:




**Ritme cardíac lent.** El dia que prengui el fàrmac per primera vegada s'haurà de quedar durant 6 hores a l'hospital, per a vigilar el ritme cardíac. La resta de dies no ha de tenir cap precaució especial, però pot ser que se senti marejat o cansat. Al cap d'1 mes el ritme cardíac es normalitza.



**Edema macular.** La màcula és una petita zona de la retina que es podria inflamar. S'haurà de realitzar una revisió oftalmològica i, a més, haurà de notificar al metge qualsevol canvi en la seva visió.




**Disminució dels glòbuls blancs,** motiu pel qual pot contreure infeccions més fàcilment. Per controlar-ho, es realitzarà anàlisi periòdicament.




**Alteració hepàtica.** També s'anirà controlant mitjançant un anàlisi de sang.

## Precaucions:




No es recomana el seu ús en l'embaràs. Durant el tractament i fins 2 mesos després d'interrompre-ho, ha d'evitar quedar-se embarassada.

## Precaucions:



No prendre Fingolimod en cas d'immunodeficiència, si té una infecció greu o si pateix algun càncer.



Durant el tractament i fins 2 mesos després de la seva interrupció, no li hauran d'administrar vacunes de virus vius atenuats: BCG, triple vírica, pòlio oral, varicel·la, febre groga, antitifoïdal oral i anticolèrica.



S'haurà de repetir la vigilància del ritme cardíac a l'hospital, si s'interromp el tractament:

- 1 dia o més, durant les 2 primeres setmanes.
- Més de 7 dies, durant les setmanes 3 i 4.
- Més de 2 setmanes a partir d'1 mes de tractament.

## Interaccions:

### Medicaments contraindicats:

1. Medicaments de la classe 1A (disopiràmida, procaïnàmida, quinina) i de la classe 3 (amiodarona, sotalol, bretilio i nibentan).
2. Antineoplàstics.
3. Immunosupressors o immunomoduladors.



### Medicaments amb els quals s'haurà de tenir precaució:

1. Betablocadors.
2. Blocadors dels canals de calci (verapamil i diltiazem).
3. Digoxina.
4. Agents colinesteràsics.
5. Pilocarpina.
6. Inhibidors de proteases.
7. Antifúngics azoles.
8. Alguns antibiòtics macròlids, com claritromicina o telitromicina.