


TRACTAMENT AMB INTERFERÓ BETA 1B

Posologia:



1 injecció subcutània cada 48 hores. Una setmana serà: dilluns, dimecres, divendres i diumenge, i la següent, dimarts, dijous i dissabte. És necessari iniciar el tractament amb escalada de dosi. La primera setmana el 25% de la dosi total, la segona el 50%, la tercera el 75% i la quarta dosis completa.


Recomanacions generals:



- No és necessari conservar el medicament a la nevera.



- Rentar-se les mans i la zona a injectar amb aigua i sabó. No és necessari usar alcohol ni altres desinfectants, ja que ressequen la pell.



- La zona a injectar ha d'estar ben relaxada, no punxar-se sobre un múscul en tensió, estries, pigues, varices, tatuatges, cicatrius o ulceracions.
- Diluir el vial i carregar la xeringa, tal com se li ha indicat.
- Pot punxar-se manualment o mitjançant l'autoinjectable, cada dia a una zona diferent de les que se l'indica a l'esquema.



30 MIN

- No fer massatges a la zona després de la injecció, només fer pressió amb el dit durant uns segons. És normal que surti una goteta de sang o de líquid.
- No aplicar cremes just abans ni després de la injecció; esperar almenys 30 minuts.

Com alleujar les possibles reaccions cutànies de la zona de la injecció:

La millor manera de prevenir-les és una bona tècnica i una correcta rotació per totes les zones d'injecció.

Pot aparèixer:

Pot aplicar:

Enrogiment



Fred local / Gel d'àloe vera / Crema de calèndula / Aigua de Bürow (aplicar, dues vegades al dia, unes gases xopades i deixar actuar 10 minuts).

Dolor/
Imflamació



Fred local / Gel d'àloe vera / Gel d'arnica, i a més, haurà de reduir la profunditat de la injecció.

Picor



Adventan pomada (2 vegades al dia) / Cremes hidratants.

Induracions



Calor local mitjançant estoreta o bossa de gel, durant 10 min, dues vegades al dia, i alternar amb crema anticel·lulítica. No injectar-se en una zona amb induracions.

Hematoma



No aplicar res o pomada Trombocid.

En cas de dolor intens o persistent, ulceracions, crostes o supuració a la zona d'injecció, contacti amb el seu equip mèdic.

Què és la síndrome pseudogripal?

Es tracta d'una reacció normal del nostre organisme davant la medicació. Aquesta es pot manifestar amb febre, cefalea, dolor a les articulacions, cansament o malestar general. Aquests símptomes s'acostumen a notar més al principi i van disminuint amb el temps.

S'aconsella:

Administrar-se la injecció a la nit, prendre un ibuprofèn de 600 mg 1 hora abans de la injecció -i un altre l'endemà en cas que persisteixin els símptomes- i seguir l'escalat de dosi propi de cada fàrmac.

