

TRACTAMENT AMB DIMETIL FUMARAT

Posologia:




Prendre 1 càpsula cada 12 hores, seguint l'escalat de dosi següent:

1^a i 2^a setmana: 120 mg cada 12 h.

3^a setmana: 120 mg pel matí i 240 mg per la nit

4^a setmana i restants: 240 mg cada 12 h.

Recomanacions generals:




Prendre-la sempre amb aliments, preferentment a la meitat de la ingesta. Es recomana menjar algun aliment gras, per exemple: mantega, oli, formatge, làctics no descremats, alvocat, etc.

Empassar-se la càpsula sencera, mai triturar-la, dissoldre-la ni mastegar-la.

En cas d'oblidar una presa, prendre-la quan ho recordi, sempre que faltin més de 4 hores fins a la següent dosi.


Efectes secundaris:



Rubefacció a la cara i al pit. No apareix sempre ni amb la mateixa intensitat. Si és molt molesta i/o persistent es pot prendre AAS 300 mg perquè la reacció desaparegui abans, o bé de manera preventiva 30 minuts abans de Dimetilfumarat.



Molèsties gastrointestinals: dolor abdominal o epigàstric, nàusees, vòmits o diarrees. El consum elevat d'alcohol pot augmentar aquestes molèsties.




Alteracions de l'hemograma, elevació dels enzims hepàtics i de les proteïnes en orina, pel que haurà de realitzar als 3 i 6 mesos de l'inici del tractament. Posteriorment cada 6 mesos, o segons criteri mèdic.

Precaucions:



No s'aconsella prendre-ho durant l'embaràs i la lactància.

Si pren anticonceptius, han de ser del tipus no combinats.



S'ha d'evitar l'ús de vacunes de virus vius atenuats: BCG, triple vírica, pòlio oral, varicel·la, febre groga, antitifoïdal i anticolèrica.

Interaccions amb altres fàrmacs:



- Fumarats (per tractar la psoriasi) tòpics/sistèmics
- Liti
- Diürètics
- Abús de fàrmacs antiinflamatoris.