


TRACTAMENT AMB INTERFERÓ BETA 1A INTRAMUSCULAR

Posologia:



1 injecció subcutània 1 cop per setmana (sempre el mateix dia de la setmana).


Recomanacions generals:



- Transportar la medicació en fred (neveres portàtils) i, quan arribi a casa, guardar-la a la nevera. No congelar. Pot mantenir-se fins a 1 mes a temperatura no superior a 25 °C.
- No injectar la medicació freda. Treure-la de la nevera almenys 1 hora abans.



- Rentar-se les mans i la zona a injectar amb aigua i sabó. No és necessari usar alcohol ni altres desinfectants, ja que ressequen la pell.



- No injectar en zones amb estries, pigues, varices, tatuatges, cicatrius o ulceracions.
- La zona a injectar és la part externa de les cuixes. Aquesta ha d'estar ben relaxada, no punxar-se sobre un múscul en tensió.
- Punxar-se mitjançant l'autoinjectable, alternant totes dues cuixes.



- No fer massatges a la zona després de la injecció, només fer pressió amb el dit durant uns segons. És normal que surti una goteta de sang o de líquid.

Possibles reaccions cutànies a la zona d'injecció:



Ocasionalment, pot aparèixer un hematoma a la zona d'injecció. Si és extens, pot aplicar pomada Trombocid.

No són freqüents un altre tipus de reaccions. En cas de dolor intens o persistent, ulceracions, crostes o supuració a la zona d'injecció, contacti amb el seu equip mèdic.

Què és la síndrome pseudogripal?

Es tracta d'una reacció normal del nostre organisme davant la medicació. Aquesta es pot manifestar amb febre, cefalea, dolor a les articulacions, cansament o malestar general. Aquests símptomes s'acostumen a notar més al principi i van disminuint amb el temps.

S'aconsella:

Administrar-se la injecció a la nit, prendre un ibuprofèn de 600 mg 1 hora abans de la injecció -i un altre l'endemà en cas que persisteixin els símptomes-.

