

# TRACTAMENT AMB TERIFLUNOMIDA

## Posologia:




Prendre 1 comprimit al dia, amb aliments o sense.  
Si ha oblidat prendre una dosi, prengui-la al més aviat possible. Si han transcorregut més de 12 hores, esperi a la següent presa i no dupliqui mai la dosi.

## Efectes secundaris:




**Afinament o caiguda lleu del cabell.** Acostuma a remetre als 6 mesos.



**Elevació de la tensió arterial,** motiu pel qual haurà de controlar-la regularment.



**Molèsties intestinals,** com flatulència, major freqüència de deposicions i més toves o, excepcionalment, diarrea.




**Alteracions de l'hemograma, perfil hepàtic i perfil pancreàtic, motiu pel qual s'haurà de realitzar anàlisi de sang:**

- **Primers 6 mesos:** cada 2 setmanes.
- **A partir dels 6 mesos:** cada 2 mesos i, posteriorment, segons criteri mèdic.

## Precaucions:



Si utilitza anticonceptius orals, ha de consultar amb el seu ginecòleg la possibilitat d'interacció amb Teriflunomida.



El fàrmac pot afectar el fetus, tant si és home com si és dona, per la qual cosa, abans de l'embaràs s'ha d'eliminar de l'organisme mitjançant medicació. Per a planificar l'embaràs, consulti amb el seu metge.

S'ha d'evitar l'ús de vacunes de virus vius atenuats: BCG, triple vírica, pòlio oral, varicel·la, febre groga, antitifoïdal oral i anticolèrica.

## Interaccions amb altres fàrmacs:



**Antibiòtics:** rifampicina, cefaclor, penicil·lina G, ciprofloxacina.

**Antiinflamatoris:** indometacina, ketoprofèn, sulfasalazina.

**Hipotensors:** furosemida.

**Hipolipemians:** rosuvastatina (s'aconsella reduir la dosi a la meitat), simvastatina, atorvastatina, pravastatina.

**Protector gàstric:** cimetidina.

**Immunosupressors/Antineoplàstics:** metotrexata, ciclosporina, daunorubicina, doxorubicina, topotecan, gefitinib, paclitaxel.

**Antiretrovirals:** zidovudina.

**Antidiabètics orals:** nateglinida, repaglinida, pioglitazona o rosiglitazona.

Alguns **anticonceptius orals.**

**Hemostàtics:** eltrombopag, warfarina.

**Antiepilèptics:** carbamazepina, fenobarbital, fenitoïna.

**Antiasmàtics:** teofil·lina.

**Antidepressius:** duloxetina, alosetró.

**Antiespàstics:** tizanidina.

**Altres:** herba de Sant Joan.