


PREVENCIÓN DE LA MALARIA

MEFLOQUINA (semanal)




Apto para niños y embarazadas, y durante la lactancia.

Si tomas otras medicaciones, consúltalo con el médico, ya que podrían producirse interacciones entre fármacos.

No indicado si se consumen drogas o alcohol.

No indicado en caso de enfermedades neurológicas o cardiológicas, o trastornos del sueño o psiquiátricos (incluyendo antecedentes familiares).

Se desaconseja en personas que precisan una motricidad fina, como submarinistas, alpinistas, conductores, pilotos...



¿CUÁNDO TOMARLO?

- 1 semana antes del viaje
- Cada semana durante el viaje
- 4 semanas tras volver del viaje

Se recomienda tomarlo durante una comida principal, con un vaso de agua grande. Si hace falta, se puede partir o machacar.

Indicado en casos muy específicos según hábitos y características del viajero. Por ello solo se prescribe de acuerdo con la valoración del médico/a, y solo puede adquirirse en el Servicio de Farmacia del hospital.

POSOLOGÍA

5-10 KG

1/8 COMPRIMIDO
CADA SEMANA

11-20 KG

1/4 COMPRIMIDO
CADA SEMANA

21-30 KG

1/2 COMPRIMIDO
CADA SEMANA

31-45 KG

3/4 COMPRIMIDO
CADA SEMANA

**MUJER
46-65 KG**

1 COMPRIMIDO
LA 1ª SEMANA

3/4 COMPRIMIDO
EL RESTO DE SEMANAS

**MUJER
> 65 KG**


1 COMPRIMIDO
CADA SEMANA

**HOMBRE
> 46 KG**

1 COMPRIMIDO
CADA SEMANA

MALARIA

PREGUNTAS FRECUENTES



¿Qué es la malaria?

Es una enfermedad infecciosa, grave y mortal, que causa un parásito y se transmite mayormente por la picadura de un mosquito. Los síntomas iniciales pueden recordar a los de la gripe: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio. También pueden producirse náuseas, vómitos y diarrea. La coloración amarillenta de la piel y los ojos suele indicar la pérdida de glóbulos rojos (anemia).



¿Es contagiosa?

No. La malaria no se transmite de persona a persona, como el resfriado o la gripe, ni por contacto sexual. Sí puede transmitirla una madre infectada a su bebé antes o durante el parto. El contagio vía transfusión sanguínea no es habitual.



¿Quién puede contraer la malaria?

Cualquier persona. La mayoría de casos se dan entre quienes viven en zonas de riesgo, donde la enfermedad es habitual. Sin embargo, las personas que viven en países sin malaria pueden infectarse cuando viajan a regiones donde hay malaria, principalmente por la picadura de un mosquito infectado.



Si estoy embarazada o quiero estarlo, ¿es recomendable viajar donde hay malaria?

No. En tales casos, es preferible no viajar a zonas donde hay riesgo de malaria y, en todo caso, consultar siempre con un/a profesional de la salud. La malaria puede afectar a la placenta, y causar anemia en la embarazada que, por su estado, suele tener las defensas más bajas. Además, algunos tratamientos preventivos están contraindicados con el embarazo.



¿Hay que administrar fármacos para prevenir la malaria a bebés y niños?

Sí, pero no todos los tipos de medicamentos disponibles. Además, las dosis deberá ajustarse un/a profesional de la salud de acuerdo con el peso del niño.



¿Me sentará mal el tratamiento preventivo?

Generalmente sienta bien y, especialmente, si se siguen las indicaciones sobre cómo tomarlo. Y en el caso de que haya unos mínimos efectos secundarios, siempre es preferible tomar la medicación a sufrir la malaria. En muy pocos casos se retira por efectos secundarios.



¿Qué hago si he olvidado tomar el medicamento preventivo?

Para un tratamiento diario, si no han pasado 12 horas, se puede tomar la pastilla y mantener la pauta habitual. Si hubieran pasado más de 12 horas, se toma la del día siguiente, pero no hay que tomar una dosis extra.

Para un tratamiento semanal, si olvidaste tomar la dosis, tómlala lo antes posible y luego espera 7 días para tomar la siguiente.



¿Qué pasa si vomito el tratamiento?

Si no ha pasado media hora desde la toma o se observa la pastilla al vomitar, hay que tomar una pastilla extra.



¿El tratamiento preventivo daña el hígado?

No. Por lo general no afecta al hígado.



¿Se puede curar la malaria?

Si se diagnostica la malaria, el personal médico indicará cuál es el tratamiento oportuno.



¿Con la quimioprofilaxis es suficiente para prevenir la malaria?

Todas las medidas preventivas suman y contribuyen a disminuir el riesgo de sufrir la enfermedad. Por ello, también debes protegerte de la picadura del mosquito con un repelente apropiado, mosquiteras, y ropa clara que cubra brazos y piernas.

Fuente: www.cdc.gov/malaria/about/faqs.html